

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik zu Bonn

Direktor: Prof. Dr. Bürger.

Ueber die Wirkung coffeinhaltigen und
coffeinfreien Kaffees auf den Grund-
umsatz von Hyperthyreotikern
und Hypertonikern.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 26. November 1936.

von

Heinz Proetel

aus Haaren bei Aachen.

Bonn 1937
Anton Brand.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Bürger.



Der Genuß coffeinhaltigen Kaffees ist weit verbreitet. Jeder Laie kennt neben den angenehmen die unangenehmen Seiten des Kaffeetrinkens: neben dem guten Geschmack und der anregenden Wirkung das Herzklopfen und die Schlafstörungen. Daher wird oft die Frage gestellt, ob der Genuß coffeinhaltigen Kaffees schädlich sei oder nicht. Wir wollen die Frage nicht allgemein stellen, sondern untersuchen, welche Wirkung der Genuß coffeinhaltigen Kaffees bei Störungen im endokrinen System hat, deren Symptome in derselben Richtung liegen, wie die Symptome, die nach Coffeinguß auftreten, und ob dort der Genuß coffeinhaltigen Kaffees kontraindiziert ist.

Die Wirkung des Coffeins erstreckt sich auf das Zentralnervensystem, das Herz, die quergestreifte Muskulatur, die Niere und den Stoffwechsel. Mittlere Dosen 0,1 bis 0,2 g werden dem Organismus schon bei ein bis zwei Tassen guten Bohnenkaffees zugeführt. Straub (1) bezeichnet in seinem auf der Düsseldorfener Naturforscherversammlung 1926 gehaltenen Vortrage über Genußgifte als übliche Dosis eine Tasse Kaffee = 0,1 g Coffein. Vielfach bleibt es aber nicht bei einer Tasse, so daß 0,1—0,2 g als eine im täglichen Leben häufig erreichte Dosis sicher nicht zu hoch angesetzt ist.

Bei diesen mittleren Dosen treten vielfach bereits die ersten Erscheinungen von seiten des Zentralnervensystems auf. Der Kaffee wirkt schlafvertreibend, erregend, er beschleunigt die Ideenassoziation und die Auffassung von Sinneseindrücken. Größere Dosen 0,4—1,0 g rufen Unruhe, Aufregung, Angstgefühl, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, Rauschzustände, Delirien, Tremor, Konvulsionen hervor. Zahlreiche interessante und komplizierte Untersuchungen sind ausgeführt worden, um die Wirkung auf die Psyche festzustellen. So fand Voigt (2), daß das psychische Tempo gesteigert wird, die Patienten werden hastig, Auch tritt Leistungsver schlechterung z. B. beim Addieren von Zahlen ein. Allers und Freund (3) fanden neben Auftreten von Pulsbeschleunigung und

Rötung des Gesichts, Auftreten von Tremor. Das Erlernen wird erleichtert, das gedächtnismäßige Wissen herabgesetzt. Die Menschen werden reizbarer. Allerdings untersuchten Allers und Freund bei größeren Dosen (30 g Kaffee). Allers (4) stellte Einschlafstörungen fest und hält Coffein für kontraindiziert bei Menschen mit besonderer Lebhaftigkeit, Reichtum an Gedanken und Vorstellungen.

Die Wirkung auf Herz und Kreislauf empfinden wir bei kleineren Dosen als Herzklopfen. Blutdruckerhöhung tritt selten nur in geringem Umfange auf. Bei größeren Dosen treten Rötung des Gesichts, gespannter, frequenter Puls und starkes Herzklopfen auf. In der Hand des Arztes stellt Coffein ein gutes Mittel für Herz und Kreislauf dar. Die absolute Kraft des Herzens wird unter bestimmten Bedingungen gesteigert. Nach toxischen Dosen tritt systolische Starre auf. Der Puls wird bei kleinen Dosen durch zentrale Vagus-erregung verlangsamt, bei großen Dosen durch Erregung der reizbildenden Elemente des Herzens beschleunigt. Die Gefäße werden durch Erregung des Zentrums im Splanchnikusgebiet verengt, durch periphere Wirkung an Niere, Gehirn und Koronarien erweitert. Um festzustellen, ob Coffein für den Kreislauf schädlich ist, wurden zahlreiche Versuche angestellt. Atzler und Lehmann (5) fanden eine Minderdisposition des Herzens für Arbeitsleistung nach Coffeingenuß. Matthias (6) stellte fest, daß nach Genuß coffeinhaltigen Kaffees, für das Herz des arbeitenden Menschen eine Zusatzbelastung auftritt, die zu Schädigungen führen kann. Drewes (7) fand eine starke Zusatzbelastung für den Kreislauf bei Leibesübungen.

Als Wirkung auf die quergestreifte Muskulatur bemerken wir eine Erhöhung des Muskeltonus. Das Kontraktionsvermögen und die Leistungsfähigkeit des quergestreiften Muskels, besonders des ermüdeten Menschen, werden gesteigert.

Coffein steigert auch die Diurese.

All dies drückt sich in einer Erhöhung des Energieumsatzes aus, so daß wir die Erhöhung des Energieumsatzes als Maßstab für die Reaktion des Organismus auf die Zufuhr von Coffein ansehen

können. Meyer (8) fand bei Untersuchungen am gefunden Menschen bei Gaben von etwa 0,17 g Coffein in Form von Kaffee, Steigerungen des Grundumsatzes bis zu 13% über den Nüchternumsatz.

Die nach Zufuhr von Coffein auftretenden Erscheinungen von seiten des Zentralnervensystems erinnern besonders stark an die Symptome, die der Hyperthyreotiker aufweist. Für ihn ist die Unruhe, Raftlosigkeit, Reizbarkeit typisch. Bei ihm ist die allgemeine Reizbarkeit des Zentralnervensystems gesteigert. Er leidet unter Schlafstörungen, Angstzuständen, Ideenflucht, Erregungen. Ferner hat er Herzklopfen und Tachykardie. Das Herz weist einen ertischen Aktionstyp auf. Es kommt auch totale Irregularität vor. Der Hyperthyreotiker zeigt eine motorische Unruhe (allerdings ist der Muskeltonus schlaff) und hat erhöhte Diurese (allerdings extrarenal bedingt). Vor allem zeigt er eine Erhöhung des Grundumsatzes.

Nun fragt es sich, was geschieht, wenn wir einem mit Thyroxin vergifteten Körper noch das Gift Coffein zuführen, das in vieler Hinsicht synergistisch mit dem Thyroxin wirkt.

Die meisten Hyperthyreotiker klagen darüber, daß sie Bohnenkaffee schlecht vertragen, weil bei ihnen Herzklopfen und Schlafstörungen besonders stark auftreten.

Wir brauchen für unsere Untersuchungen genau meßbare Veränderungen im Organismus. Von allen auftretenden Symptomen läßt sich der Anstieg des Grundumsatzes am exaktesten messen. Auch ist er ja ein guter Maßstab für die Reaktion des ganzen Organismus. Deshalb bestimmten wir den Grundumsatz. Außerdem registrierten wir Blutdruck und Puls.

Der Grundumsatz des Hyperthyreotikers ist fast immer gesteigert. Steigerungen von über 100% über den Sollumsatz sind keine Seltenheit. Die spezifisch-dynamische Wirkung der Eiweißkörper ist bei Hyperthyreotikern besonders groß und der Stoffwechsel steigt bei körperlicher Arbeit besonders stark an.

Außerdem beeinflußt die Psyche den Energieumsatz des Hyperthyreotikers erheblich, was bei der psycholabilen Stimmungslage der

Patienten nicht ohne Bedeutung ist. So ist am ersten Tage der Untersuchung der Energieumsatz wegen der Angst vor der Untersuchung immer sehr hoch. Auch an Tagen, an denen sich die Patienten Sorgen über ihre Krankheit oder familiäre Angelegenheiten machen, steigt der Umsatz stark an. Wir sahen z. B. (Versuch Nr. 8), daß der Energieumsatz an dem Tag, an dem die Patientin coffeinfreien Kaffee bekommen hatte, den Wert des Vortages, an dem sie coffeinhaltigen Kaffee bekommen hatte, überstieg. Doch war die Steigerung sicher nicht dem coffeinfreien Kaffee zuzuschreiben, sondern der Aufregung der Patientin, denn es fiel auf, daß die Patientin sehr erregt war und viel nach ihrer Krankheit fragte. Als wir nach einer Woche den Versuch wiederholten, blieb die ungewöhnliche Steigerung aus.

Es gibt auch Patienten, die von Jugend auf an starken Kaffee gewöhnt sind, und die nach Kaffeegenuß keine subjektiven Beschwerden haben. Bei ihnen braucht die Umsatzsteigerung nicht so ausgeprägt zu sein, kann aber auch auffallend stark sein. Gewöhnung bedeutet keine Unschädlichkeit.

Anordnung der Untersuchungen.

Wir zogen zu unseren Untersuchungen Patienten mit leichten Hyperthyreosen heran. Die Patienten lebten 3 Tage vor der Untersuchung fleischfrei, mieden Kaffee, Tee, große körperliche Anstrengungen und nach Möglichkeit das Einnehmen von Schlafmitteln. Am ersten Versuchstage wurden nach einer Stunde absoluter Ruhe nüchtern 2 Grundumsatzbestimmungen gemacht. Es wurde dazu der Apparat von Knipping benutzt. An diesem ersten Tage sollten sich die Patienten an Apparat und Umgebung gewöhnen. Am zweiten Tage wurde nach einer Stunde Ruhe 1 Nüchternwertsbestimmung gemacht. Darauf bekamen die Patienten einen Aufguß von 17 g Java-Kaffee und 125 ccm Wasser, also eine Tasse Kaffee. Damit wurde unter Zugrundelegung von 1,0 bis 1,2% Coffeingehalt der Kaffeebohne beim Java-Kaffee und unter weiterer Zugrundelegung von 85 bis 87% Übergang des Coffeins in das Getränk 0,14 bis 0,17 g Coffein dem Körper zugeführt, also eine im täg-

lichen Leben häufig erreichte Dosis. $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 Stunden nach Genuß des Kaffees wurde der Energieumsatz bestimmt und zugleich Blutdruck und Puls festgestellt. Zum Vergleich wurde die Untersuchung unter sonst gleichen Bedingungen am dritten Tage mit Kaffee Hag wiederholt. Kaffee Hag enthält etwa 0,05 % Coffein. Demnach wurden dem Körper bei unseren Versuchsbedingungen durch Kaffee Hag etwa 0,007 g Coffein zugeführt. (Im folgenden ist Java-Kaffee als coffeinhaltig, Kaffee Hag als coffeinfrei bezeichnet.)

Untersuchungen:

1. Frau I. J., 31 Jahre alt, 164,5 cm groß, 57 kg schwer. Leidet an mittelschwerem Basedow. Nach Behandlung mit Röntgenstrahlen trat Besserung ein.

Anamnese:

geb. 1903

1917 Skrofulose

1919 Lungenpitzenkatarrh

1921 Grippe

August 1933 Beschwerden: Allgemeine Körperschwäche, müde, elend, Schmerzen in allen Gliedern, besonders in der Schultergegend. In den letzten Wochen starker Haarausfall.

Befund: Schilddrüse etwas vergrößert. RR 120/70, Puls 88, Tremor in beiden Händen.

Pat. ist leicht erregbar. Hb 66%.

Erythr. 3 600 000.

März 1933 Blutjodgehalt 517%

August 1933 Grundumsatz um 41,4% erhöht.

Bestrahlung der Schilddrüse bekommt der Pat. nicht gut.

Oktober 1933 nach der Bestrahlung ist der Grundumsatz nur noch um 20% gesteigert.

März 1934 Grundumsatz um 8% gesteigert.

Februar 1935 Blutjodgehalt 357%.

Sollumsatz: 1363 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
15.II.34	2,001	2,16	0,923	1557	+ 14,2%	nüchtern
9h 30	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
10h 00	2,105	2,21	0,950	1600	+ 17,3%	30 Min. n. Genuß
10h 30	2,013	2,16	0,928	1562	+ 14,6%	1 Std. n. Genuß
11h 30	1,985	2,16	0,915	1557	+ 14,2%	2 Std. n. Genuß

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
20. II. 34	1,75	1,79	0,976	1301	—	4,6% nüchtern
9h 20	eine Tasse		coffeinhaltigen	Kaffee		
9h 50	2,013	2,01	0,996	1471	+	7,8% 30 Min. n. Genuß
10h 20	2,032	2,05	0,987	1495	+	9,6% 1 Std. n. Genuß
11h 20	2,085	2,02	1,000	1476	+	8,2% 2 Std. n. Genuß
12h 20	2,043	2,03	1,000	1487	+	9,0% 3 Std. n. Genuß
13h 00	2,043	2,03	1,000	1487	+	9,0% 3 Std. 45 Min. n. Gen.
16. I. 35	57 kg.	Sollumsatz	1359			
	1,923	1,99	0,966	1443	+	6,1% nüchtern
9h 30	eine Tasse		coffeinfreien	Kaffee		
10h 00	1,941	2,04	0,948	1479	+	8,8% 30 Min. n. Genuß
10h 30	1,874	1,98	0,946	1430	+	5,2% 1 Std. n. Genuß
11h 30	1,944	2,03	0,957	1468	+	8,0% 2 Std. n. Genuß
12h 30	1,747	2,02	0,863	1439	+	5,8% 3 Std. n. Genuß

2. Frau P. L., 46 Jahre alt, 160 cm groß, 64 kg schwer, leidet an schwerer Hyperthyreose und hohem Blutdruck. Exophthalmus, leichter Tremor.

Anamnese:

geb. 1889

Uterusamputation, Ovariectomie.

1931 Nervenzusammenbruch

Februar 1934 Pat. fühlt sich matt und schwach, Schwindelanfälle.

Befund: leichte Kropfanlage, Cor 3/10

syistol. Geräusch über allen Ostien, paukender 2. P. T. RR 210/90

Mai 1934 Puls 72, Exophthalmus, Schlaf unruhig

Juli 1934 leichter Tremor, Puls 84

Grundumsatz + 40%, + 60%; nach Bestrahlen keine wesentliche Besserung.

Sollumsatz: 1348 Cal

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
13. 2. 35	2,481	2,51	0,988	1828	+	35,6% nüchtern
9h 30	eine Tasse		coffeinfreien	Kaffee		
10h 00	2,597	2,56	1,01	1868	+	38,5% 30 Min. n. Genuß
10h 30	2,494	2,60	0,956	1886	+	39,9% 1 Std. n. Genuß
11h 30	2,569	2,57	0,999	1874	+	39,0% 2 Std. n. Genuß
12h 30	2,658	2,47	1,06	1805	+	33,9% 3 Std. n. Genuß

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
27. 2. 35	2,543	2,48	1,02	1812	+ 34,4 %	nüchtern
9h 45	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee					
10h 15	2,749	2,63	1,03	1922	+ 42,5 %	30 Min. n. Genuß
11h 00	2,687	2,69	0,996	1965	+ 45,7 %	1 Std. 15 Min. n. Gen.
11h 45	2,816	2,64	1,06	1926	+ 42,8 %	2 Std. n. Genuß
12h 45	3,151	2,83	1,10	2069	+ 53,4 %	3 Std. n. Genuß

3. Frau J. K., 41 Jahre alt, 159 cm groß, 60 kg schwer; leidet an mittlerer Hyperthyreose. Zustand nach zweimaliger Strumaoperation.

Anamnese:

geb. 1894

1923 Strumaoperation

September 1933 Grundumsatz um 30% erhöht

Oktober 1933 erneute Strumaoperation

Januar 1934 Cholecystektomie

Mai 1934 Grundumsatz 12,7% über dem Sollumsatz.

Beschwerden: Schmerzen im ganzen Körper: Kopf und Extremitäten. Zittern und Kribbeln in den Extremitäten. Appetitlosigkeit, Schwindelanfälle, innere Unruhe, Schlaf schlecht, Druck in der Herzgegend, Angstgefühle.

RR 140/80, Puls 84.

Sollumsatz: 1331 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
5. 4. 35	1,787	2,27	0,785	1593	+ 19,8 %	nüchtern
25. 4. 35	1,919	2,26	0,849	1602	+ 20,4 %	nüchtern
9h 25	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
9h 55	1,845	2,27	0,809	1603	+ 20,4 %	30 Min. n. Genuß
10h 25	2,049	2,26	0,903	1625	+ 22,0 %	1 Std. n. Genuß
11h 25	1,886	2,25	0,836	1593	+ 19,6 %	2 Std. n. Genuß
12h 25	1,729	2,25	0,767	1574	+ 18,2 %	3 Std. n. Genuß
8. 5. 35	1,880	2,25	0,832	1596	+ 19,9 %	nüchtern
9h 35	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee					
10h 05	2,078	2,45	0,845	1741	+ 30,8 %	30 Min. n. Genuß
10h 35	1,937	2,33	0,829	1649	+ 23,8 %	1 Std. n. Genuß
11h 35	1,852	2,26	0,816	1598	+ 20,0 %	2 Std. n. Genuß
12h 35	1,911	2,31	0,824	1635	+ 22,8 %	3 Std. n. Genuß
13h 35	1,901	2,29	0,827	1624	+ 22,0 %	4 Std. n. Genuß

4. Frau M. H., 24 Jahre alt, 165 cm groß, 61 kg schwer. Pat. leidet an mittelschwerem Basedow. Sie wird bestrahlt.

Sollumfat: 1432 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umlatz	Ab- weichung	
24. 8. 35	2,187	2,39	0,912	1718	+ 19,9%	nüchtern
9h 45	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee					
10h 15	2,168	2,59	0,835	1836	+ 28,2%	30 Min. n. Genuß
10h 45	1,870	2,51	0,742	1747	+ 21,9%	1 Std. n. Genuß
11h 45	1,988	2,59	0,767	1806	+ 26,1%	2 Std. n. Genuß
12h 45	2,203	2,16	0,843	1851	+ 29,2%	3 Std. n. Genuß
26. 8. 35	1,959	2,40	0,814	1695	+ 18,3%	nüchtern
9h 35	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
10h 05	1,861	2,41	0,769	1690	+ 18,0%	30 Min. n. Genuß
10h 45	1,843	2,42	0,762	1690	+ 18,0%	1 Std. 10 Min. n. Gen.
11h 35	1,876	2,57	0,729	1782	+ 24,4%	2 Std. n. Genuß
12h 35	2,087	2,75	0,757	1918	+ 33,9%	3 Std. n. Genuß

5. Frau R., 48 Jahre alt, 161,5 cm groß, 70 kg schwer. Leidet an leichter Hyperthyreose.

Anamnese:

geb. 1887

1918 Luesinfektion, seitdem in jedem Jahre eine antiluetische Kur

1926 Gelenkrheumatismus

Seit 1934 Herzangst, Druck auf der Brust.

Pat. trinkt viel Bohnenkaffee.

Sollumfat: 1395 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umlatz	Ab- weichung	Puls	RR
10.12.35	1,345	2,359	0,57	1570	+ 12,5%	60	135/90 nüchtern
	1,545	2,1	0,737	1457	+ 4,5%		
11.12.35	1,36	1,87	0,73	1300	— 6,7%	56	125/75 nüchtern
10h 30	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee						
11h 00	1,73	2,44	0,704	1680	+ 20,4%	60	130/75 30 M. n. G.
12h 00	2,28	2,65	0,865	1880	+ 34,7%	62	120/70 1 Std. 30 M. n. Genuß
13h 00	1,72	2,62	0,659	1790	+ 28,3%	62	125/75 2 Std. 30 M. n. Genuß

Zeit	CO ₂		O ₂	RQ	gef.	Ab-	Puls	RR
	in 10	in 10			Umsatz	weichung		
	Min.	Min.						
12.12.35								
9h 20	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
9h 50	1,65	2,03	0,815	1425	+	2,1%	52	125/75 30 M. n. G.
10h 20	1,585	1,91	0,83	1345	—	2,5%	52	120/70 1 Std. n. G.
11h 20	1,005	1,97	1,02	1433	+	2,7%	54	115/65 2 Std. n. G.

Unruhig. Verfürt nach Java-Kaffee Schmerzen in der Nierengegend.

6. Frau L., 47 Jahre alt, 150 cm groß, 64 kg schwer. Leidet an mittlerer Hyperthyreose. Trinkt viel und gern Kaffee.

Sollumfatz: 1317 Cal.

Zeit	CO ₂		O ₂	RQ	gef.	Ab-	Puls	RR
	in 10	in 10			Umsatz	weichung		
	Min.	Min.						
16.12.35	1,48	2,3	0,645	1565	+	18,8%	68	nüchtern, unruhig
	1,59	2,09	0,76	1455	+	10,5%		
17.12.35		2,15					70	130/75 nüchtern, Apparat verfaßt
9h 35	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee							
10h 05	1,74	2,25	0,774	1785	+	35,5%	66	125/80 30 M. n. G.
10h 35	1,6	2,58	0,623	1750	+	32,8%	64	135/80 1 Std. n. G.
11h 35	1,85	2,36	0,784	1650	+	25,2%	66	140/85 2 Std. n. G.
12h 35	1,62	2,35	0,692	1615	+	22,6%	68	140/85 3 Std. n. G.
18.12.35								
9h 45	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
10h 15	1,54	2,19	0,7	1510	+	14,6%	66	130/80 30 M. n. G.
10h 45	1,43	2,37	0,6	1605	+	21,8%	68	140/85 1 Std. n. G.
11h 45	1,79	2,46	0,73	1705	+	33,2%	68	130/80 2 Std. n. G.

Am 18. 12. sehr unruhig

20. 5. 36 Sollumfatz: 1320 Cal.

	1,94	2,04	0,663	1285	—	2,6%	130/95	nüchtern
9h 45	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
10h 15	2,10	2,34	0,646	1472	+	11,5%		30 M. n. G.
10h 45	2,18	2,22	0,717	1408	+	6,6%	135/90	1 Std. n. G.
11h 45	2,14	2,09	0,742	1329	+	0,6%		2 Std. n. G.

7. Frau G., 30 Jahre alt, 159,5 cm groß, 61 kg schwer. Leidet an leichter Hyperthyreose, ist sehr unruhig, ist von Jugend auf an starken Kaffee gewöhnt.

Anamnese:

Bemerkt seit Monaten zunehmende Schwellung am Hals, Herzklopfen, Schweiß, viel Stühle.

Sollumfat: 1387 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef.	Ab-	Puls	RR	
				Umsatz	weichung			
8. I. 36	1,569	2,53	0,62	1715	+ 23,6%	70	120/70	nüchtern
	1,724	2,51	0,687	1721	+ 24,1%	68	110/70	nüchtern
9. I. 36	1,293	2,4	0,54	1595	+ 15,0%	66	110/70	nüchtern
10h 10	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee							
10h 40	1,783	2,53	0,705	1745	+ 25,8%	62	110/80	10 M. n. G.
11h 10	1,463	2,37	0,618	1605	+ 15,7%	68	95/65	1 Std. n. G.
12h 10	1,529	2,41	0,635	1640	+ 18,2%	64	100/65	2 Std. n. G.
13h 10	1,439	2,52	0,57	1690	+ 21,8%	68	100/70	3 Std. n. G.
10. I. 36	1,424	2,51	0,57	1685	+ 21,5%	66	100/65	nüchtern unruhig
9h 40	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
10h 10	1,579	2,54	0,627	1720	+ 24,0%	66		30 M. n. G:
10h 40	1,472	2,65	0,555	1770	+ 27,6%	66	100/70	1 Std. n. G.
11h 40	1,414	2,445	0,58	1647	+ 18,7%	64	100/65	2 Std. n. G.

8. Frau K., 47 Jahre alt, 164 cm groß, 60 kg schwer. Leidet an mittelschwerer Hyperthyreose.

Anamnese:

Bemerkt seit 1935 Abmagerung. Im letzten viertel Jahr etwa 10 Pfund Gewichtsabnahme.

Pat. ist sehr ängstlich, stark erregt. Ist nicht an Kaffee gewöhnt.

Sollumfat: 1308 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef.	Ab-	Puls	RR	
				Umsatz	weichung			
21. I. 36	2,041	2,665	0,765	1860	+ 42,5%	88	135/80	nüchtern, stark erregt
	1,9335	2,52	0,7675	1760	+ 34,5%	88	125/80	nüchtern
22. I. 36	1,861	2,36	0,79	1655	+ 26,6%	82	125/80	nüchtern
9h 20	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee							
9h 50	2,011	2,46	0,8175	1730	+ 32,2%	88	135/80	30 M. n. G.
10h 20	1,916	2,46	0,78	1720	+ 31,5%	84	135/80	1 Std. n. G.
11h 20	1,936	2,36	0,82	1663	+ 27,2%	84	135/80	2 Std. n. G.
12h 20	1,961	2,42	0,81	1700	+ 30,0%	88	135/80	3 Std. n. G.
23. I. 36	2,221	2,645	0,84	1870	+ 43,0%	98	135/80	nüchtern, stark erregt
9h 30	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
10h 00	1,831	2,54	0,722	1760	+ 35,4%	86	135/80	30 M. n. G.
11h 00	2,071	2,46	0,84	1740	+ 33,0%	86	130/80	1 Std. n. G.
12h 00	1,901	2,42	0,785	1705	+ 30,5%	88	135/80	2 Std. n. G.

Pat. machte sich an diesem Tage besonders viel Sorgen um ihre Krankheit und war besonders stark erregt. Die Werte für den Energieumsatz lagen weit über denen des vorherigen Tages. Trotzdem fallen die Werte nach coffeinfreiem Kaffee ab. Der Versuch wurde nach einer Woche wiederholt. In dieser Woche wurde die Patientin behandelt, indem sie fleischfrei lebte, nach dem Mittagessen eine Stunde mit einer Eiskrawatte um den Hals ruhte und Luminaletten einnahm.

Zeit	CO ₂	O ₂	RQ	Umsatz	gef.	Ab- weichung	Puls	RR
	in 10 Min.	in 10 Min.						
31. I. 36	1,783	2,36	0,755	1643	+	25,6%	84	125/80 nüchtern
9h 40	eine Tasse coffeinfreien Kaffee							
10h 10	1,813	2,305	0,7875	1612	+	23,2%	80	125/80 30 M. n. G.
10h 50	Apparat verlag							
11h 40	1,843	2,36	0,7825	1650	+	26,2%	84	125/80 2 Std. n. G.
12h 40	1,843	2,34	0,7875	1640	+	25,4%	88	125/75 3 Std. n. G.

Pat. war ruhig.

Außerdem wurde bei der Pat. an diesem Tage der Blutzucker-gehalt vor und nach dem Versuch festgestellt. Es zeigte sich, daß sich der Blutzuckerpiegel im Verlauf der 4 Stunden des Ver-fuchs um etw 8 mg% senkte. Von 90;88 mg% auf 81;81 mg%.

9. Frau M., 38 Jahre alt, 166 cm groß, 58,5 kg schwer. Leidet an leichter Hyperthyreose.

Anamnese:

2 Entbindungen, jedesmal Eklampsie.

Klagt in letzter Zeit über Schlaflosigkeit, Schwindelanfälle mit Brech-reiz. Kleine Anstrengungen führen zu Aufregung.

Trinkt viel Kaffee.

Sollumsatz: 1343 Cal.


Zeit	CO ₂	O ₂	RQ	Umsatz	gef.	Ab- weichung	Puls	RR
	in 10 Min.	in 10 Min.						
19. 2. 36	2,073	2,355	0,88	1680	+	25,0%		nüchtern
	1,688	2,0	0,845	1417	+	5,5%		nüchtern

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Abz. weichung	Puls	RR	
20. 2. 36	1,813	2,03	0,893	1450	+	8,0%	80	110/75 nüchtern
9h 20	eine Tasse		coffeinhaltigen		Kaffee			
9h 50	1,878	2,31	0,815	1625	+	21,0%	76	105/70 30 Std. n. G.
10h 20	2,113	2,445	0,865	1737	+	29,3%	72	105/65 1 Std. n. G.
11h 35	2,023	2,415	0,837	1710	+	27,3%		105/65 2 Std. 15 M. n. Genuß
12h 35	2,123	2,5	0,85	1770	+	31,8%	76	100/60 3 Std. n. G.
21. 2. 36	1,853	2,07	0,895	1480	+	10,2%	76	100/65 nüchtern
9h 50	eine Tasse		coffeinfreien		Kaffee			
10h 20	1,683	2,21	0,7625	1540	+	14,6%	76	100/60 30 M. n. G.
11h 05	1,823	2,24	0,815	1578	+	17,5%	76	100/65 1 Std. 15 M. n. Genuß
11h 50	1,773	2,09	0,85	1480	+	10,2%	72	105/65 2 Std. n. G.
12h 25	1,983	2,34	0,85	1658	+	22,7%	80	110/70 2 Std. 30 M. n. Genuß


Die Ergebnisse der Versuche 2 und 5 seien graphisch dargestellt. Es wurde die Abweichung des gefundenen Umsatzes von dem nach Knippingfchen Tabellen ermittelten Sollumsatz in Prozent errechnet und in die Kurven als Ordinate, die Zeit der Umsatzbestimmung in Stunden als Abszisse eingetragen. Als Nüchternwert wurde der niedrigste bei nüchternen Patienten gefundene Wert genommen.

% Abweichung vom Sollumsatz

54 2) P. L.



38 5) R.



— Energieumsatz nüchtern
 - - - „ nach coffeinhaltigem Kaffee
 ... „ nach coffeinfreiem Kaffee

Auswertung der Untersuchungsergebnisse.

Es ist schwierig bei Hyperthyreotikern vergleichbare Basiswerte zu erhalten, weil, wie oben schon auseinandergesetzt, der Energieumsatz von dem Grade der jeweiligen psychischen Unruhe stark beeinflusst wird.

Zweitens hat sich gezeigt, daß bei längerem Nüchternsein der Energieumsatz in vielen Fällen auch beim Gefunden stark ansteigt. 2 Versuchsprotokolle gesunder Personen seien als Beispiel angeführt. Beide haben am Vorabend des Versuchstages zum letzten Mal gegessen.

Frau E. T. 22 Jahre alt, 157 cm groß, 44 kg schwer.

Sollumsatz: 1264 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
18. 4. 34						
9h 00	1,377	1,79	0,768	1252	— 0,9%	nüchtern
10h 00	1,493	1,77	0,843	1255	— 0,7%	„
11h 00	1,484	1,70	0,869	1214	— 3,9%	„
12h 00	1,530	1,72	0,887	1232	— 2,5%	„
13h 00	1,566	1,87	0,833	1328	+ 5,0%	„
14h 00	1,597	1,88	0,847	1335	+ 5,6%	„
15h 00	1,561	1,93	0,805	1363	+ 7,8%	„

Herr J. P. 29 Jahre alt, 170 cm groß, 59 kg schwer.

Sollumsatz: 1533 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
30. I. 34						
9h 15	2,198	2,41	0,908	1734	+ 13,1%	nüchtern
10h 15	2,265	2,43	0,929	1755	+ 14,5%	„
11h 15	2,091	2,34	0,893	1673	+ 9,1%	„
12h 15	2,313	2,38	0,971	1727	+ 12,6%	„
13h 15	2,266	2,53	0,894	1811	+ 18,1%	„
14h 15	2,305	2,56	0,899	1835	+ 19,1%	„
15h 00	2,319	2,57	0,900	1845	+ 20,3%	„

Eine Erklärung für diesen Anstieg findet sich vielleicht darin, daß nach der Arbeit von Meyer in vielen Fällen bei längerem Nüchternsein ein Absinken der Blutzuckerwerte gelegentlich sogar bis zu hypoglykämischen Werten einsetzt. Aus der Insulinphysiologie ist bekannt, daß das Absinken der Blutzuckerwerte zu Unlustgefühlen und Unruhe führt, die sich nicht selten motorisch auswirken. Auch Atmung und Herztätigkeit sind, wenn auch wenig, gesteigert. All dieses muß auch den Energieumsatz beeinflussen, wodurch alle an nüchternen Patienten durchgeführten Untersuchungen ihre natürliche Begrenzung erfahren. Daher sind auch bei unseren Patienten die letzten oft erhöhten Werte nicht zu brauchen.

Die Untersuchungen 2, 3, 4, 5, 9 zeigen auf den ersten Blick, daß der coffeinhaltige Kaffee den oft an sich schon erhöhten Umsatz stark, der coffeiarmer Kaffee den Umsatz garnicht oder nur wenig steigern. Aber auch die anderen Versuchsergebnisse liegen in derselben Richtung. Bei den Untersuchungen 1 und 7 muß man nicht die absoluten Werte, sondern die prozentualen Erhöhungen über den Tagesausgangswert betrachten. Die Untersuchungen 6 und 8 scheinen zunächst herauszufallen, da sich nach coffeinfreiem Kaffee ein starker Anstieg zeigt. Die Wiederholung ergibt aber überzeugende Unterschiede zwischen coffeinhaltigem und coffeinfreiem Kaffee.

Es wurde die prozentuale Steigerung der Nüchternwerte und der unter den oben angegebenen Bedingungen brauchbaren Höchstwerte nach coffeinhaltigem und coffeinfreiem Kaffee über den Sollumsatz, die prozentuale Steigerung der Höchstwerte nach coffeinhaltigem und coffeinfreiem Kaffee über den Ausgangswert des jeweiligen Versuchstages und die Differenz der beiden letzten Zahlen in folgende Tabelle eingetragen.

	% Steigerung des Energieumsatzes über den Sollumsatz				% Steigerung des Energieumsatzes über den Tagesausgangswert								
	nüchtern		n.c.halt.		n.c.halt.		n.c.halt. c.haltig—c.frei						
		Kaffee		Kaffee		Kaffee		Kaffee					
1. I.J.	—	4,6	+	9,6	+	8,8	+	14,2	+	2,7	+	11,5	
2. P.L.	+	34,4	+	45,7	+	39,9	+	11,3	+	4,3	+	7,0	
3. J.K.	+	19,8	+	30,8	+	22,0	+	10,9	+	1,6	+	9,3	
4. M.H.	+	18,3	+	28,2	+	24,4	+	8,3	+	6,1	+	2,2	
5. R.	—	6,7	+	34,7	+	2,7	+	41,4	+	9,4	+	32,0	
6. L.	—	2,6	+	35,5	+	11,6	+	25,0	+	14,2	+	10,8	
7. G.	+	15,0	+	25,8	+	27,6	+	10,8	+	6,1	+	4,7	
8. K.	+	25,6	+	32,2	+	26,2	+	5,6	+	0,6	+	5,0	
9. M.	+	5,5	+	29,3	+	17,5	+	21,3	+	7,3	+	14,0	
Im Durchschnitt		+	11,63	+	30,2	+	20,07	+	16,54	+	5,8	+	10,7

Die Abweichung des Nüchternumsatzes vom Sollwert beträgt im Durchschnitt + 11,6% ein Wert, der eben noch außerhalb der Fehlergrenze der Methode liegt.

Fünf Patienten weisen einen sicher erhöhten Nüchternumsatz auf, ein Ausdruck der Hyperthyreose. Die weitere Steigerung des erhöhten Umsatzes durch Kaffee ist individuell verschieden. Immer ist die Steigerung durch coffeinhaltigen Kaffee stärker als durch coffeinfreien Kaffee. Die Steigerung durch coffeinhaltigen Kaffee schwankt zwischen + 5,6% und + 41,4% über den Ausgangswert des Tages. Im Durchschnitt beträgt sie + 16,5%. Die Steigerung durch coffeinfreien Kaffee beträgt im Durchschnitt + 5,8% über den Ausgangswert des Tages. Die Werte für die Mehrsteigerung des Umsatzes durch coffeinhaltigen über coffeinfreien Kaffee am gleichen Kranken schwanken zwischen + 2,2% und + 32,0%, sie liegen im Durchschnitt bei + 10,7%.

Nach der Arbeit von Meyer schwankt die Steigerung des Energieumsatzes durch coffeinhaltigen Kaffee beim Gefunden zwischen + 8,0% und + 13,0%, sie beträgt im Durchschnitt etwa 10,0%.

Die Steigerung des Umsatzes durch coffeinhaltigen Kaffee beim Hyperthyreotiker liegt im Durchschnitt um 6,5% höher als beim Gefunden. Die Mehrsteigerung scheint also nicht besonders stark,

doch wird man verstehen, wie nachteilig dieses für den Hyperthyreotiker ist, wenn man bedenkt, daß es sich um eine zusätzliche Erhöhung des an sich schon durch den Thyreoidismus gesteigerten Stoffwechsel handelt. Die zusätzliche Steigerung von + 15% auf + 30% ist für den Organismus sicher ernster zu werten als eine Steigerung von 0 auf 15%. Da die Abweichungen alle in derselben Richtung liegen, kommt ihnen sicher eine reelle Bedeutung zu.

Die Steigerungen nach coffeinfreiem Kaffee sind mit wenigen Ausnahmen gering und weichen von denen beim Gefunden nicht wesentlich ab.

Blutdruck und Puls wiesen keine Besonderheiten auf.

Diese Resultate zeigen, daß die erregende Wirkung coffeinhaltiger Getränke beim Hyperthyreotiker schon bei Mengen, die im täglichen Leben häufig erreicht werden, besonders stark zum Ausdruck kommt. Sie sind für den Arzt ein Anlaß mehr, dem Hyperthyreotiker den Genuß coffeinhaltigen Kaffees zu verbieten und ihn gegebenenfalls durch coffeinfreien zu ersetzen. Das Ziel der Therapie ist es ja, den Patienten zu beruhigen und damit den hohen Energieumsatz zu senken.

Die Wirkung des Coffeins bei Hypertonikern.

Die essentielle Hypertonie ist anfangs eine rein funktionelle Störung des Kreislaufapparates. Sie besteht in einem Krampfzustand der Muskularis der Arteriolen ohne anatomisch nachweisbare Veränderungen. Erst im weiteren Verlauf entwickelt sich die Arteriolo-fklerose, die Verdickung der Muskularis und des Endothels in den Arteriolen. Man denkt sich diese pathologische Tonussteigerung der Arteriolen durch veränderte Einstellung der den Blutdruck regelnden Zentren im Zwischenhirn und der Substantia grisea im verlängerten Mark verursacht. Verschiedene Momente können über die Zentren eine Blutdruckerhöhung auslösen. So anatomische Veränderungen in dieser Gegend. Auch Reflexe von der Peripherie beeinflussen den Blutdruck. Der Blutdruck sinkt durch Druckerhöhung im Carotissinus (Sinusnerv) und in der Aortenwurzel

(Nervus Depressor). Ausschaltung dieser Blutdruckzügler führt zu dauerndem Blutdruckanstieg. Auch von den gedehnten Nierenbecken kann auf reflektorischem Weg der Blutdruck erhöht werden. Verengerung der Harnleiter und Prostatahyperthrophie können zu Blutdruckerhöhung führen. Bei Beseitigung des Harnabflußhindernisses sinkt der Blutdruck auf die Norm zurück.

Doch spielen in der Hauptsache psychische, konstitutionelle und hormonale Faktoren eine Rolle.

Sicherlich bestehen Beziehungen zwischen der essentiellen Hypertonie und der Thyreotoxikose. Denn schon äußerlich zeigt ein Teil der Hypertoniker Stigmata, die auf eine erhöhte Schilddrüsen-tätigkeit hinweisen. Es sind auch klinisch meßbare Erscheinungen vorhanden, die derartige Zusammenhänge wahrscheinlich machen.

So zeigten Bürger und Möbius (10), daß der Jodgehalt des Blutes bei Hypertonikern oft erhöht ist.

Ferner zeigte sich, daß der Grundumsatz bei vielen Hypertonikern zum Teil beträchtlich gesteigert ist. Doch lassen sich keine Parallelen zwischen Blutjodgehalt, Grundumsatzsteigerung und Blutdrucksteigerung erkennen.

Die Annahme, daß bei essentieller Hypertonie oft Überfunktion der Schilddrüse vorhanden ist, findet sich im Einklang mit vielen Beobachtungen, die in der Literatur veröffentlicht sind. So weist Ottfried Müller (10) darauf hin, daß es verschiedene Anhaltspunkte dafür gebe, daß bei Hypertonikern endokrine Korrelationsstörungen vorliegen. E. Kaufch (11) stellt fest, daß beim Hyperthyreotiker der Blutdruck selten erniedrigt, öfters auch normal ist, daß dagegen meistens eine Neigung zu Blutdruckerhöhung oder eine Dauerhypertension besteht. Ähnlich schreibt K y l i n (12), daß bei gewissen Fällen von Thyreoidastörungen, wie ab und zu bei Morbus Basedowii, Blutdrucksteigerung eintritt. Auch von unseren Hyperthyreotikern hat eine Patientin einen Blutdruck von RR 210/90 (P. L. Nr. 2). Der Blutdruck bei den Patientinnen J. K. Nr. 3, L. Nr. 6, K. Nr. 8 steht an der oberen Grenze der Norm. Nonnenbruch (13) fand stets einen gesteigerten Umsatz bei Hyper-

tonikern, doch hatte ein Teil seiner Kranken Zeichen beträchtlicher kardialer Insuffizienz. Mannaberg (14), Bauer (15), Handel (16), Kisch (17) fanden öfters erhöhten Grundumsatz bei Hypertonikern. Die Ergebnisse sind im Material ein und deselben Autors nicht einheitlich. Handel fand beim dritten Teil seiner Kranken mit essentieller Hypertonie Umsatzsteigerungen über 15%. Von unseren 7 Hypertonikern zeigen 3 eine Umsatzsteigerung von mehr als 15% über den Sollumsatz.

Bei den dargelegten engen Beziehungen zwischen essentieller Hypertonie und Hyperthyreose ist nun zu untersuchen, ob das Coffein ähnliche Wirkungen auf den Organismus des Hypertonikers wie auf den des Hyperthyreotikers ausübt. Bei dem Einfluß des Coffeins auf Herz und Kreislauf ist Blutdruck und Puls zu registrieren.

Anordnung der Untersuchungen:

Wir zogen zu unseren Untersuchungen Hypertoniker heran, deren Hochdruck nach der Anamnese, dem Ergebnis der Nierenfunktionsprüfung, der Harnuntersuchung und der Reststickstoffbestimmung im Blut sicher extrarenal bedingt war. Die Untersuchungen wurden in der gleichen Weise angeordnet, wie diejenigen bei den Hyperthyreotikern. Es wurde stets verglichen die Wirkung einer Tasse Java-Kaffees (17 g auf 125 ccm Wasser) mit einer Tasse Kaffee Hag (17 g auf 125 ccm Wasser).

Untersuchungen:

10. Frau F. S., 53 Jahre alt, 151,5 cm groß, 54,5 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1881. Als Kind oft Halsentzündung.

Seit 1919 Gallenblasenbeschwerden (Koliken).

Februar 1934 Beschwerden: Starke Kopfschmerzen mit Erbrechen, gleichzeitig starke Schmerzen in der rechten Seite, Luftmangel bei Treppensteigen, manchmal abends geschwollene Füße.

Befund: Cor. Töne rein, leise. 2. A.T. betont. RR 205/155.

Puls 98:

Aortenklorose, Aorta erheblich geschlängelt und verbreitert.

E.K.G. linkstypisch

Konzentrationsversuch. 1004—1018.

November 1934 Apoplexie.

Sollumsatz: 1203 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
19.12.34	1,328	1,53	0,863	1093	9,1 %	nüchtern
9h 15	eine	Tasse	coffeinfreien	Kaffee		
9h 45	1,368	1,58	0,861	1128	— 6,2 %	30 Min. n. Genuß
10h 30	1,388	1,64	0,844	1164	— 3,2 %	1 Std. 15 M. n. Genuß
11h 15	1,439	1,63	0,878	1169	— 2,8 %	2 Std. n. Genuß
12h 15	1,463	1,63	0,894	1169	— 2,8 %	3 Std. n. Genuß
13h 00	1,380	1,61	0,853	1148	— 4,5 %	3 Std. 45 Min. n. Gen.
15.12.34	1,283	1,54	0,829	1091	— 9,3 %	nüchtern
9h 15	eine	Tasse	coffeinhaltigen	Kaffee		
9h 45	1,709	1,98	0,862	1409	+ 17,1 %	30. Min. n. Genuß
10h 15	1,546	1,73	0,889	1242	+ 3,2 %	1 St. n. Genuß
11h 15	1,468	1,77	0,825	1254	+ 4,2 %	2 Std. n. Genuß
12h 15	1,570	1,81	0,864	1291	+ 7,3 %	3 Std. n. Genuß
13h 00	1,513	1,83	0,825	1294	+ 7,5 %	3 Std. 45 Min. n. Gen.

11. Frau M. M., 52 Jahre alt, 150 cm groß, 66 kg schwer.

Anamnese: F.A. Vater an Herzschlag, Mutter an Herzwasserfucht gestorben. Schwester herzkrank.

E.A.

geb. 1883.

1902 Herzbefschwerden, auf Herzneurose behandelt.

1921 wegen eines Herzleidens im Krankenhaus

1929 Schwindel, Herzklopfen

RR 255/140, Alb. +

1931 Plaut-Vincentische Angina

RR 125/120, Alb. +, Sed. reichlich Erythr. Hyaline Zylinder, granulierte Zylinder. Spez. Gew. 1010—1014.

März 1935 Beschwerden: Müdigkeit, starker Durst; muß nachts häufig große Mengen Wasser von heller Farbe lassen.

Mai 1935 Befund: Cor 3/10/5. 2. A.T. betont

RR 270/150. E.K.G. path Linkstyp

Rest-N 63 mg%. Spez. Gew. bis 1014.

Blutjodgehalt 57%

Grundumsatz + 15,5%

Hb 63 %, Erythr. 4 300 000

Alb. +, Urobilinogen +.

Sollumfat: 1324 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
13. 3. 35	1,985	2,35	0,843	1666	+ 25,8%	nüchtern
	1,934	2,35	0,820	1663	+ 25,6%	„
20. 3. 35	1,918	2,26	0,846	1605	+ 21,2%	nüchtern
9h 30	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee					
10h 00	1,986	2,38	0,831	1688	+ 27,4%	30 Min. n. Genuß
10h 30	2,071	2,46	0,84	1745	+ 31,7%	1 Std. n. Genuß
11h 30	1,932	2,44	0,789	1715	+ 29,5%	2 Std. n. Genuß
12h 30	2,212	2,63	0,84	1864	+ 40,8%	3 Std. n. Genuß
27. 3. 35	65,5 kg	Sollumfat: 1320 Cal.				
	1,976	2,2	0,897	1576	+ 19,3%	nüchtern
9h 20	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
9h 50	1,995	2,21	0,901	1584	+ 20,0%	30 Min. n. Genuß
10h 20	2,002	2,24	0,891	1605	+ 21,5%	1 Std. n. Genuß
11h 20	1,885	2,21	0,851	1570	+ 18,9%	2 Std. n. Genuß
12h 20	1,81	2,22	0,814	1567	+ 18,7%	3 Std. n. Genuß

12. A. B., 64 Jahre alt, 154,5 cm groß, 90 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1871

Januar 1934 RR 200/130

April 1935 RR 210/115, Puls 96

E.K.G. nicht path. linkstypisch

Beschwerden: starkes Säufen in Kopf und Ohr

Herzbeschwerden

Rest-N 31,5 mg%.

Sollumfat: 1506 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
30. 4. 35	1,687	2,3	0,733	1595	+ 5,9%	nüchtern
	1,703	2,34	0,726	1623	+ 7,7%	„
9h 20	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
9h 50	1,85	2,39	0,771	1674	+ 11,1%	30 Min. n. Genuß
10h 20	1,902	2,4	0,791	1684	+ 11,8%	1 Std. n. Genuß
11h 20	1,919	2,37	0,809	1669	+ 10,8%	2 Std. n. Genuß
12h 20	1,787	2,36	0,756	1644	+ 9,8%	3 Std. n. Genuß

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
10. 5. 35	90,5	kg	Sommufatz: 1511	Cal.		
	1,689	2,26	0,745	1575	+ 4,2%	nüchtern
9h 25	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee					
9h 55	2,294	2,71	0,846	1920	+ 27,0%	30 Min. n. Genuß
10h 25	1,889	2,37	0,796	1664	+ 10,0%	1 Std. n. Genuß
11h 25	1,811	2,53	0,713	1754	+ 16,0%	2 Std. n. Genuß
12h 25	1,916	2,43	0,786	1707	+ 12,9%	3 Std. n. Genuß

13. Frau A. J., 60 Jahre alt, 149 cm groß, 51 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1875

1895 Pleuritis sicca

1910 Gelenkrheumatismus nach Angina

1930 Gallenblasenextirpation

1933 Schmerzen in der rechten Seite.

Befund: Cor nach links verbreitert, syst. Geräusch an der Spitze,
RR 200/120, Abdomen: Druckschmerzhaftigkeit der Leber und
Nierengegend.

Nierenfunktionsprüfung: kann schlecht konzentrieren, keine
Zylinder, vereinzelte Erythr. und Leukoz.

1935 Schmerzen in der Nierengegend, Kopfschmerzen, Herz-
klopfen, RR 210/100. Rest-N nicht erhöht.

Sollumfatz: 1142 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	
24. 9. 35	1,730	2,37	0,729	1644	+ 43,9%	nüchtern
	1,755	2,34	0,749	1628	+ 42,5%	„
	1,907	2,3	0,827	1626	+ 42,3%	„
	1,841	2,3	0,786	1615	+ 41,4%	„
25. 9. 35	1,687	2,26	0,743	1576	+ 38,0%	nüchtern
9h 40	eine Tasse coffeinhaltige Kaffee					
10h 10	1,884	2,4	0,782	1685	+ 47,5%	30 Min. n. Genuß
10h 55	1,773	2,52	0,701	1741	+ 52,4%	1 Std. 15 Min. n. Gen.
11h 55	1,766	2,47	0,712	1709	+ 49,6%	2 Std. 15 Min. n. Gen.
12h 55	1,603	2,72	0,589	1831	+ 60,3%	3 Std. 15 Min. n. Gen.
26. 9. 35	1,7	2,2	0,771	1539	+ 34,7%	nüchtern
9h 40	eine Tasse coffeinfreien Kaffee					
10h 10	1,829	2,24	0,814	1583	+ 38,6%	30 Min. n. Genuß
10h 40	1,666	2,26	0,736	1569	+ 37,3%	1 Std. n. Genuß
11h 40	1,76	2,24	0,784	1571	+ 37,5%	2 Std. n. Genuß
12h 40	1,855	2,32	0,783	1658	+ 45,1%	3 Std. n. Genuß

14. Frau T. S., 65 Jahre alt, 148,5 cm groß, 58,5 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1870: als Kind Mafern, als Schulkind „Drüfen“, Bleichfuch-
tichtig. 10 Geburten
1903 Blutpucken
1910 Rippenfellentzündung
1915 Trockene Rippenfellentzündung
Seit 1920 oft Kopfschmerzen
Seit 1923 Druckgefühl in der Herzgegend, Atemnot, Herzklopfen,
oft des Nachts.
Befund: systol. Geräusch, 2. A.T. klingend
RR 190 RR 220
1927 geschwollene Füße.
1932 Schwindelanfälle RR 220/110
Juni 1932 RR 235/130, Aderlaß
Mai 1933 RR 240/100; in der ganzen Zeit Verdauungsbeschwerden.
September 1935 RR 180/100, Schwindel, RR 230/100, Aderlaß
Januar 1936 RR 210/95, Aderlaß, RR 165/80
Rest-N 45,78 mg%.
Pat. trinkt viel Bohnenkaffee, nimmt in letzter Zeit Luminal-
tabletten ein.

Während der Untersuchung stieg der Blutdruck nach Genuß von
coffeinhaltigem Kaffee von 170/80 auf 200/95 und fiel nur
langsam ab. Nach coffeinfreiem Kaffee blieb die Blutdruck-
steigerung aus.

Sollumsatz: 1182 Cal.

Zeit	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	gef. Umsatz	Ab- weichung	Puls	RR	
28. I. 36	1,411	2,5	0,565	1675	+ 41,5%	64	170/85	nüchtern
29. I. 36	1,681	1,99	0,845	1410	+ 19,3%	64	170/80	„
9h 30	eine Tasse		coffeinhaltigen	Kaffee				
10h 00	1,663	2,1	0,079	1470	+ 24,1%	60	200/95	30 M. n. G.
10h 30	1,823	2,14	0,85	1515	+ 27,3%	64	190/90	1 Std. n. G.
11h 30	1,575	2,39	0,66	1683	+ 42,3%	64	185/85	3 Std. n. G.
12h 30	1,663	2,34	0,71	1615	+ 36,7%	68	185/90	3 Std. n. G.
I. 2. 36	1,713	1,77	0,691	1280	+ 8,3%	64		nüchtern
9h 35	eine Tasse		coffeinfreien	Kaffee				
10h 05	1,538	1,83	0,84	1295	+ 9,5%	68	165/80	30 M. n. G.
10h 50	1,793	1,91	0,94	1375	+ 16,3%	66	175/85	1 Std. 15 M. n. Genuß
11h 30	1,618	1,93	0,84	1365	+ 15,4%	72	170/85	2 Std. n. G.

15. Herr F. H., 53 Jahre alt, 168,5 cm groß, 69 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1882

1908 Iridektomie rechts

1920 Lungen und Rippenfellentzündung

1921 Iridektomie links

1928 Apoplexie. Seitdem Herzbeschwerden, immer aufgereg.

1934 Starkes Herzklopfen, schlechter Schlaf

RR 160/100, reine paukende Herztöne

September 1934 RR 170/100, RR 140/100

Mai 1936 Rest-N 49,7 mg%.

Sollumfat: 1494 Cal.

Zeit	CO ₂		O ₂	RQ	gef. Ab-		Puls	RR	
	in 10	in 10			Umsatz	weichung			
	Min.	Min.							
3. 2. 36	2,053	2,64	0,78	1779	+	19,1%	64	165/100	nüchtern
	1,833	2,205	0,8325	1560	+	4,4%	62	155/100	„
4. 2. 36	1,793	2,39	0,75	1660	+	11,1%	68	155/90	„
9h 30	eine Tasse coffeinhaltigen Kaffee								
10h 00	2,043	2,46	0,83	1740	+	16,4%	60	170/100	30 M. n. G.
10h 30	1,828	2,32	0,785	1623	+	8,6%	60	170 105	1 Std. n. G.
11h 30	1,943	2,48	0,785	1735	+	16,1%	60	165/100	2 Std. n. G.
5. 2. 36	1,853	2,44	0,76	1700	+	13,8%	64	160/100	nüchtern
9h 30	eine Tasse coffeinfreien Kaffee								
10h 00	1,75	2,37	0,735	1650	+	10,4%	60	160/100	30 M. n. G.
10h 45	1,576	2,32	0,68	1590	+	6,4%	60	160/100	1 Std. 15 M. n. Genuß
11h 30	1,683	2,5	0,674	1715	+	14,8%	64	170/115	2 Std. n. G.

Pat. ist nicht an starken Kaffee gewöhnt. Nach Bohnenkaffee verspürt Pat. Herzklopfen.

Der Blutdruck steigt nach Bohnenkaffee von RR 155/90 auf RR 170/100.

16. Frau M. N., 62 Jahre alt, 165 cm groß, 62 kg schwer.

Anamnese:

geb. 1873

August 1934 Stechen in der linken Seite, „Hartleibigkeit“.

Schlaf schlecht, nervös.

Befund: Cor nach links verbreitert, lautes systol. Geräusch über der Mitralis. 2. A.T. betont: RR 185/80.

Senkung 38/75.

September 1934 Hitzeandrang zum Kopf, Beklemmungsgefühl auf der Brust. Geschwollene Füße. Herzklopfen

Befund: Leises systol. Geräusch über der Spitze.

RR 190/90. Schmerzen in der linken Seite, Blähungen, leichte Oedeme an den Unterschenkeln.

RR 180/90.

November 1934. Ab und zu nachts starke Erstickungsanfälle.
Beklemmungsgefühl in der Brust, Pat. muß dann laut
schreien. Die Anfälle dauern einige Min.

Januar 1935. RR 175/115. Pat. klagt über Anfälle.

März 1935 RR 190/85

Mai RR 180/90

Juni RR 160/90

Oktober RR 175/90

November RR 195/80

RR 210/95

Dezember RR 210/100

Januar 1936 RR 180/90

Februar RR 185/100 Aderlaß


Mai Rest-N 37,8 mg%.

Sollumsatz: 1447 Cal.


Zeit			gef.		Ab-		RR
	CO ₂ in 10 Min.	O ₂ in 10 Min.	RQ	Umsatz	weichung	Puls	
17. 2. 36	1,823	2,4	0,67	1675	+ 15,7%	72	170/90 nüchtern
	1,933	2,58	0,74	1790	+ 23,7%	80	165/65 „
18. 2. 36	2,203	2,445	0,902	1750	+ 21,0%	76	150/95 „
8h 35	eine Tasse		coffeinhaltigen		Kaffee		
9h 05	2,053	2,48	0,83	1680	+ 16,1%	76	160/90 30 M. n. G.
9h 45	2,213	2,62	0,845	1855	+ 28,2%	76	160/85 1 Std. 10 M. n. Genuß
11h 00	2,093	2,605	0,8025	1830	+ 24,4%	72	165/85 2 Std. 30 M. n. Genuß
11h 40	1,968	2,365	0,8325	1670	+ 15,4%	80	170/85 3 Std. n. G.
19. 2. 36	2,153	2,445	0,88	1745	+ 20,6%	76	150/85 nüchtern
9h 00	eine Tasse		coffeinfreien		Kaffee		
9h 30	Apparat verlag						
10h 00	Apparat verlag						
10h 30	1,808	2,4	0,755	1670	+ 15,4%	68	155/85 1 Std. 30 M. n. Genuß
11h 30	2,083	2,55	0,817	1795	+ 24,0%	72	165/90 2 Std. 30 M. n. Genuß

Die Ergebnisse der Untersuchungen 11 und 14 seien graphisch
dargestellt.

% Abweichung vom Sollwert



14) T. S.



— Energieumsatz nüchtern
 „ nach coffeinhaltigem Kaffee
 - - - - - „ nach coffainfreiem Kaffee

	% Steigerung des Energieumsatzes über den Sollumsatz			% Steigerung des Energieumsatzes über den Tagesausgangswert			
	nüchtern	n.c.halt.	n.c.frei.	n.c.halt.	n.c.frei.	c-haltig—c.frei	
		Kaffee	Kaffee	Kaffee	Kaffee	RR	
10. F.S.	— 9,3	+ 17,1	— 2,8	+ 26,4	+ 6,3	+ 20,1	205/155
11. M.M.	+ 19,3	+ 31,7	+ 21,5	+ 10,5	+ 2,2	+ 8,3	270/150
12. A.B.	+ 4,2	+ 27,0	+ 11,8	+ 22,8	+ 4,1	+ 18,7	210/115
13. A.J.	+ 34,7	+ 52,4	+ 38,6	+ 14,4	+ 3,9	+ 10,5	210/100
14. T.S.	+ 8,3	+ 42,3	+ 16,3	+ 23,0	+ 8,0	+ 15,0	170/80
15. F.H.	+ 4,4	+ 16,4	+ 14,8	+ 5,3	+ 1,0	+ 4,3	160/100
16. M.N.	+ 15,7	+ 28,2	+ 24,0	+ 7,2	+ 3,4	+ 3,8	170/90
Im Durchschnitt	+ 11,4	+ 30,72	+ 17,74	+ 15,74	+ 4,12	+ 11,52	

Auswertung der Untersuchungsergebnisse.

Die Untersuchungen zeigen, daß verhältnismäßig viele Hypertoniker einen erhöhten Nüchternumsatz aufweisen, was mit den erwähnten Erfahrungen der Literatur übereinstimmt. Von 7 Patienten haben 3 eine Steigerung von über 15% über den Sollumsatz. Der Höchstwert beträgt + 34%. Im Durchschnitt beträgt die Steigerung + 11,04%. Dekompensierte Hypertoniker finden sich nicht unter unserem Krankengut.

5 Patienten zeigen eine erhebliche weitere Steigerung des an sich schon erhöhten Umsatzes nach coffeinhaltigem Kaffee. Die Steigerung über den Ausgangswert des Tages schwankt zwischen + 5,3% und + 26,4%. Sie beträgt im Durchschnitt + 15,74%. Fraglos ist dieser Effekt der erregenden Wirkung des Kaffees zuzuschreiben. Denn der Anstieg des Umsatzes nach coffeinfreiem Kaffee ist wesentlich geringer und fällt in den Bereich der Fehlergrenze der Methode. Er beträgt im Durchschnitt nur 4,12%. Die Mehrsteigerung durch coffeinhaltigen Kaffee über die durch coffeinfreien schwankt zwischen 3,8 und 20,1%, sie beträgt im Durchschnitt 11,52%.

Die Untersuchungen haben also den überzeugenden Beweis erbracht, daß coffeinhaltige Getränke in Mengen wie sie im täglichen Leben erreicht werden, bei Hypertonikern den an sich schon häufig gesteigerten Umsatz weiter in die Höhe treiben. Der zusätzliche An-

stieg der Verbrennungen übertrifft noch die Steigerungen des Umsatzes durch die gleiche Menge Kaffees beim Gesunden. Das bedeutet eine gesteigerte Coffeinempfindlichkeit der Kranken mit essentieller Hypertonie. Gelegentlich kann sogar eine zusätzliche Erhöhung des Blutdruckes eintreten (Untersuchung 14 und 15). Der erhöhte Umsatz stellt natürlich erhöhte Anforderungen an alle Organe. Das Herz, das durch die Hypertension schon überlastet ist, erleidet durch die Steigerung der Verbrennungsvorgänge noch eine zusätzliche Belastung. Da das Versagen des Herzens eine häufige Todesursache für Hypertoniker bildet, hat dieser allen Grund, jede zusätzliche Belastung des Kreislaufs, somit auch den Genuß coffeinhaltiger Getränke zu meiden.

Literatur.

1. Straub: Über Genußgifte, Naturwissenschaften, 1926, Seite 1099.
 2. Voigt: Dtsche. Med. Wschr. 1934, Nr. 41, S. 1554.
— Dtsche. Med. Wschr. 1936, Nr. 5, S. 179.
 3. Allers und Freund: Ztschr. f. d. gef. Psych. und Neurol. 1925.
 4. Allers: Med. Wschr. 1927, Nr. 32.
— Dtsche. Med. Wschr. 1928, Nr. 20.
 5. Atzler und Lehmann: Med. Welt, 1934, Nr. 15.
 6. Matthias: Münch. Med. Wschr., 1934, Nr. 15, S. 555.
 7. Drewes: Dtsche. Med. Wschr., 1935, Nr. 50, S. 2010.
 8. Meyer: Ztschr. f. Unterf. d. Lebensmittel, 1935, Bd. 69, H. 6.
 9. Bürger und Möbius: Kl. Wschr., 1934, Nr. 38, S. 1344.
 10. O. Müller: Verh. Dtsch. Gef. Kreislaufforsch. 1932.
 11. Kaufch: Diff. Berlin 1932.
 12. Kylin: Die Hypertoniekrankheiten, S. 99, Berlin 1926.
 13. Nonnenbruch: Münch. Med. Wschr. 1925, S. 1064.
 14. Mannaberg: Med. Klin. 1922; 145, 1924, 84.
 15. Bauer: Verh. Dtsch. Gef. inn. Med. 1927, 148.
 16. Händel: Z. Klin. Wschr. 100, 725 (1924).
 17. Kifch: Klin. Wschr. 1929, 400.
-

Lebenslauf.

Am 11. Januar 1912 wurde ich als Sohn des Regierungsbau-
meisters Hermann Proetel und seiner Ehefrau Ida, geb. Grunde-
mann, in Saßnitz auf Rügen geboren.

Ich besuchte die Grundschule in Magdeburg und das Reform-
realgymnasium in Magdeburg und Aachen, wo ich Ostern 1931 die
Reifeprüfung ablegte.

Seit Ostern 1931 studierte ich Medizin. Die vorklinischen Se-
mester verbrachte ich in Bonn und Kiel, die klinischen in Göttin-
gen, Berlin und Bonn. Das ärztliche Staatsexamen bestand ich am
11. 12. 36 vor dem Prüfungsausschuß in Bonn.
